

УДК: 159. 937.53.

С. М. Бондаревич, здобувач

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
кафедра диференціальної і експериментальної психології

ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ХВОРИХ УРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

У статті розглядаються ознаки основних індивідуально-типологічних властивостей хворих, які страждають урологічними захворюваннями. Проведений докладний аналіз психіки суб'єктів. Приводиться методичний інструментарій, який дозволяє строго локалізувати їх у зоні "рівноважного типу" темпераменту.

Ключові слова: "урологічний профіль", "рівноважний" тип темпераменту, переважаюча хвороба.

Використовуючи поняття "психічне" і "соматичне", не можна не торкнутися проблеми душі і тіла, розділяючи їх, ми виділяємо різні площини розуміння феномену людини. Біологічна (соматична), психічна, соціальна, екологічна площини перетинаються одна з одною (психофізіологія, психосоматика і та ін.). Кожен розлад (хвороба) в плані етіології (аналіз умов виникнення) і в плані терапії (профілактики), можна розташувати в різних площинах: соматичні захворювання в психічній площині, а психічні розлади — в соматичній. Зводити ті та інші захворювання тільки до біологічної або тільки до психічної площини не можна, даний підрозділ страждає довільністю [9].

За науковими даними — простатит є не тільки медичною, але і соціальною проблемою. Частота простатиту за даними наукової літератури у осіб до 30 років досягає 40,4%. Це найбільш працездатний і активний в соціальному плані вік.

Досвід лікарів, що накопичується і удосконалюється, висуває необхідність пізнання ролі психіки в етіології розвитку різних захворювань.

Етіологія як поняття (грец. *aitia* — причина і *.logія*) — це вивчення і пояснення причин патологічної поведінки [8].

Пацієнти, які страждають захворюваннями сечової системи і сечостатевої системи, можуть бути виділені в окрему групу, оскільки вони мають свій "урологічний портрет".

Проблема хронічних неінфекційних урологічних захворювань залишилася в стороні від вивчення фахівцями. Необхідність її розглянути детальніше, визначити основні індивідуально-типологічні параметри цієї групи пацієнтів пов'язана з великою кількістю осіб, схильних до даної патології.

Основний підхід у психології — пошук "певного профілю" суб'єкта. Найчастіше фахівцями проводиться діагностика з використанням багатоступінчатої батареї тестів, але всі вони засновані на аналізі, в основному, характеру і поведінки особистості (багатофакторний аналіз в клінічній практиці, тривимірна система в педагогіці) [2, 3, 5, 9].

Що таке хворий із захворюванням сечостатевої системи або "хворий з простатитом"? Часто це викликає неоднозначну відповідь. Є пацієнти, у яких позитивний ефект від терапії з'являється з перших днів лікування, є, навпаки, пацієнти, які не мають позитивний ефект від призначеної їм терапії, хоча докладені зусилля в подоланні хвороби були рівнозначні. Ймовірно, тут і прихована та відмінність, яка їх розділяє, і, відповідно, об'єднує в одну загальну групу.

Маючи на увазі все вище доведене, головна мета нашої праці — це визначити основні психологічні параметри в етіології і патогенезі хворих урологічного профілю.

При аналізі пацієнтів, які страждають хронічними неінфекційними захворюваннями урологічного профілю, було зроблене спостереження, що хронічними захворюваннями сечової і сечостатевої систем страждають індивіди, що належать до певного психологічного типу. Це врівноважений тип темпераменту.

У роботі Цуканова Б. І. про походження видів різних психологічних типів людської популяції визначено співвідношення типів темпераменту, згідно тому, як відбувалися формування і розвиток внутрішніх органів у процесі еволюції тваринного світу [7].

Цуканов Б. І. довів експериментально, що кожен окремий індивід має свою власну одиницю часу. Носій власної одиниці часу — індивід, для зручності названий "т-типом".

"Власна одиниця часу є природженою, жорсткою константою і залишається незмінною протягом всього життя індивіда. Власна одиниця часу як природжена характеристика індивідуального мозку пов'язана з динамікою збудження і гальмування нервових процесів, які визначають особливості темпераменту. Відомо також, що ці процеси в певних мозкових структурах функціонально визначають ступінь виразності таких особливостей темпераменту, як реактивність, екстравертівськість, стабільність-тривожність і т. д." [7].

Процентне співвідношення індивідів людської популяції в розподілі типологічних груп на великій вибірці доведено методом найменших квадратів [6]. Серед них виявився п'ятий, середній тип темпераменту — "врівноважений".

Він розташовується між сангвіноїдною групою темпераменту ($\tau=0,8$ с) і меланхолоїдною групою темпераменту ($\tau=1,0$ с) — "рівноважний" тип темпераменту ($\tau=0,9$ с) [6].

"Рівноважний" тип темпераменту виконує роль межі між сангвіноїдною і меланхолоїдною групами, тому і об'єднує окремі риси з обох поведінкових груп" [7].

Даний тип темпераменту цікавить нас найбільше, оскільки саме цей тип найбільш усього схильний до хронічних неінфекційних захворювань сечової і сечостатевої системи.

Використовуючи показник хронічних неінфекційних захворювань на великій вибірці, Цуканов Б. І. виділив, що саме у рівноважного типу темпераменту найбільш всього схильна до захворювань сечостатева система. Для індивідів рівноважного типа темпераменту ($\tau=0,9$ с) найбільш слабким місцем є нирки і пов'язано це з еволюційним органогенезом [7].



Рис. 1. Лінійне розташування типів темпераменту і їх процентне співвідношення за Цукановим Б. Й. (6)

Для аналізу психологічних і патопсихологічних індивідуальних параметрів, які є характерними при захворюваннях урологічного профілю, був використаний метод факторного аналізу Г. Айзенка про екстраверсію-інтроверсію і нейротизм-стабільність. Вони якнайповніше відповідають на поставлене завдання і дозволяють провести аналіз індивідуальних психологічних властивостей, які характеризують відмінності в нозології захворювань "урологічного профілю".

На підставі всього вищесказаного було проведено визначення основних індивідуально-психологічних параметрів урологічних хворих з виділенням їх по окремих нозологіях (використовувалося поняття хронічних неінфекційних захворювань), а також проведена строга диференціація, що дозволяє локалізувати на лінійній шкалі психологічних типів "рівноважний" тип, до якого належать пацієнти, які страждають урологічними захворюваннями.

У досліджені брали участь пацієнти з хронічними захворюваннями сечової і сечостатевої систем у кількості 30 чоловік.

Психологічна діагностика проводилася з використанням тесту Г. Айзенка. Це дозволило диференціювати пацієнтів за шкалами екстраверсії-інтроверсії і нейротизм-стабільність. Оцінка проводилася в балах від 0 до 12 і від 12 до 24 по обох шкалах. Дані результатів обстеження дозволили строго диференціювати і достатньо чітко виділити і локалізувати пацієнтів, що відносяться до "рівноважного" типу темпераменту.

Достатньо показовим в клінічному прояві захворювань при визначенні по осіх екстраверсія-інтроверсія, нейротизм-стабільність є наявність суб'ективних і об'ективних проявів порушень функцій різних органів (локалізація і течія) основної патології-урологічні хвороби, як патології "переважаючі хвороби".

Для повнішої картини зіставлення результатів психологічного обстеження і аналізу клінічних проявів в процесі дослідження проводилось:

вивчення анамнезу захворювання, клінічні прояви захворювання, динаміка течії, супутня патологія, оцінювалася результативність дії (суб'ективні і об'ективні дані — лабораторні дослідження, дані ультразвукового дослідження та ін.).

Дані подані в таблиці 1.

Таблиця 1

**Виразність екстраверсії-інтроверсії і нейротизму-стабільноті в балах
у суб'єктів з клінічним проявом захворювань**

№ п/п	ПІБ Рік народ- ження. стать.	Екстра- інтро версія	Нейротизм- стабільність	Діагноз	Дані хворого Анамнез, скарги	Дані діагностичного обстеження
1.	С. Н.И. 1975 г. жін.	10	14	СКХ, хронічний цистит.	хворіє 2 роки дизурія, болі проміж.	Локал. болі поясн. обл, сечового міхура. УЗИ.: СКХ, хронічний. цистит.
2.	Д. О.П. 1967 г. чол.	12	12	Хронічний калькул. простатит, везикуліт уретрит. СКХ	хворіє 2 роки болі проміжності, поясн. області дизурія	Локал. болі пром, прост. сем. пуз. УЗИ.: СКХ, кальк. простатит./ везикуліт.
3.	М. Д.П. 1939 р. чол.	13	14	Хрон. кальк. простатит, аденоматоз простати. СКХ. Пієлонефрит Холецистит.	Хворіє 10 років. дизурія, прискорен. статевий акт, болі проміж, в ануся.	Болі локальні проміж., поясн. УЗИ: калькул. простатит, вузол прав. долі. СКХ. Холецистит.
4.	Л. В.В. 1984 р. чол.	13	12	Хронічний калькул. простатит, везикуліт СКХ	хворіє 1 рік. Болі в проміж., дизурія	Лок. болі проміж., дизурія УЗИ: кальк. простатіт, везикуліт. СКХ.
5.	Д. А.С. 1979 р. чол.	11	12	СКХ Хрон. калькул. простатит везикуліт. Пієлонефрит.	Хворіє 5 рок. болі проміж, дизурія, Прискорення статевого акту	Локальні болі поясн. і проміж., дизурія УЗИ: кальк простатит, везикуліт. СКХ
6.	Л. А.Ф. 1983 р. жін.	13	12	СКХ, хронічн. пієлонефрит, нефро- птоz зліва хронічний цистит	Хворіє 1 рік. болі поясн. обл., дизурія.	Локал. болі поясн обл. УЗИ: СКХ, пієлонефрит, нефроптоz зліва. Хроніч. цистит.

Продовження таблиці 1

№ п/п	ПІБ Рік народ- ження. стать.	Екстра- інтро версія	Нейротизм- стабільність	Діагноз	Дані хворого Анамнез, скарги	Дані діагностичного обстеження
7.	Р. В.Т. 1960 р. чол.	12	13	СКХ Хронічний калькул. простатит, везикуліт. Холецистит.	хворіє 8 років. болі проміжності, поясн обл., дизурія. Прискорення статевого акту.	Лок. болі області нирок, внизу живота. УЗИ: СКХ, кальк простатит, везикуліт. Холецистит.
8.	М. В.А. 1977 р. чол.	11	11	Хронічний калькул. простатит, везикуліт, СКХ.	Хворіє 1 рік. болі проміжності дизурія, Зниження статевого акту	Лок. болі проміжності Дизурія. УЗИ: калькул. простатит везикуліт. СКХ.
9.	До. Е.Г. 1949 р. чол.	14	10	Хронічний простатит, везикуліт. СКХ гіпертонічна хвороба (шунтирван- ня сосудин серця) холецистит.	хворіє 8 років біль поясн. області проміжності, в уретрі, знижка статевого акту.	Локальні болі поясн. області. проміжності, уретрі. УЗИ: СКХ, заст. простатит, холецистит.
10.	П. В.Б. 1953 р . чол.	13	13	СКХ, хронічний калькул. простатит Холецистит Гіпертонічна хвороба	хворіє 5 рок біль поясн області, проміжності, дизурія. Прискорен. статевого акту. АД160/90.	Лок. болі проміжності, поясн. обл. дизурія. УЗИ: СКХ кальк простатит, холецистит.
11.	С. В.Г. 1973 р. чол.	14	10	СКХ., хронічн. простатит, Везикуліт варико- целе зліва.	хворіє 1 рік. біль поясничн. обл. проміжності, дизурія. Прискорений статевий акт	Локал. болі пром., дизурія УЗИ: СКХ, заст простатит, везикуліт

Індивідуально-типові властивості хворих урологічного профілю

Продовження таблиці 1

№ п/п	ПІБ Рік народ- ження. стать.	Екстра- інтро версія	Нейротизм- стабільність	Діагноз	Дані хворого Анамнез, скарги	Дані діагностичного обстеження
12.	Д. А.В. 1976 р. чол.	14	10	СКХ Нефролітіаз зліва Хронічний простатит, везикуліт	хворіє 1 рік. Болі пояс. області і проміж., уретрі.	Лок болі обл. простати УЗИ: СКХ кальк. простатит, везикуліт.
13.	Д. Ю.Н. 1964 р. чол.	13	11	СКХ Хронічний простатит, везикуліт, уретрит, прискорений статевий акт.	хворіє 8 рок. болі області нирок і проміж., наруж. статевих органів-корінь мошонки, дизурія прискорене сім'випорску- вання	Лок. болі проміжності. Дизурія. УЗИ: СКХ, заст. простатит, везикуліт
14.	Ш. В.С. 1970 р. чол.	13	10	Хронічний калькул. простатит, везикуліт СКХ, піело- нефрит	Хворіє 5 рок. болі в проміж., дизурія	Лок. болі проміж. Дизурія. УЗИ: СКХ, кальк простатит, везикуліт.
15.	М. Е.В. 1979 р. чол.	11	13	Хронічний калькул. простатит. везикуліт. СКХ	хворіє 5 років Болі в обл. проміж.	Лок. болі проміж. УЗИ: СКХ кальк. простатит, везикуліт
16.	П. И.В. 1975 р. жін.	13	13	СКХ цисто- пілонефрит	хворіє 5років. Болі поясн. обл. Дизурія.	Локал. болі поясн. обл УЗИ: СКХ. Пілонефрит.
17.	Р. А.Н. 1972 р. чол.	12	12	СКХ хронічний простатит, атонія простати. Дизбактеріоз. Безпліддя.	хворіє 8 років Болі проміжності. поясниці, дизурія	Локал. болі проміж. УЗИ: СКХ простатит.

Продовження таблиці 1

№ п/п	ПІБ Рік народ- ження, стать.	Екстра- інтро версія	Нейротизм- стабільність	Діагноз	Дані хворого Анамнез, скарги	Дані діагностичного обстеження
18.	В.В.С. 1978 р. чол.	11	14	СКХ, хронічні простатит. везикуліт. Знижка статевого акту	хворіє 8років. Болі проміж. Дизурія, знижка статевого акту	Локал. болі проміж. дизурія УЗИ: СКХ, кальк простатит, везикуліт
19.	Д. Е.М. 1983 р. чол.	12	12	СКХ Хронічний калькул. простатит	хворіє 5 рок. Болі поясн. області і проміжності.	Локал. болі проміж. дизурія. УЗИ: СКХ кальк простатит
20.	Л. И.П. 1969 р. чол.	13	13	СКХ, хронічний простатит, везикуліт, прискорений статевий акт.	Хворіє 5 років. Болі проміж. поясн.області, прискорене сім'явипорсу- вання.	Лок болі пояс області, проміжності УЗИ:СКХ кальк простатит
21.	Б. А.А. 1979 р. чол.	10	14	СКХ, хронічний простатит	Хворіє 1 рік. Болі у паху і обл. проміж. Знижка статевого акту	Локал. болі проміжності УЗИ:СКХ кальк простатит
22.	Р. Н.М. 1978 р. чол.	13	12	Хронічний простатит, везикуліт прискорене сім'явипор- скування	Хворіє 5 років, болі проміжності, дизурія, Прискорений статевий акт	Лок. болі проміжності Дизурія УЗИ: СКХ, заст простатит.
23.	Р. Н.В. 1972 р. жін.	10	14	СКХ, хронічний цистит.	хворіє 2 роки. Болі поясн і проміж, дизурія	Локал.болі поясн, дизурія. УЗИ: пієлонефрит, СКХ
24.	Б.А.Б. 1979 р. чол.	12	13	Хронічний простатит, СКХ, знижка статевого акту.	хворіє 1 рік Болі проміж, дизурія знижка статевого акту.	Локал болі пром УЗИ: СКХ, застойн. простатит.

Індивідуально-типові властивості хворих урологічного профілю

Продовження таблиці 1

№ п/п	ПІБ Рік народ- ження. стать.	Екстра- інтро версія	Нейротизм- стабільність	Діагноз	Дані хворого Анамнез, скарги	Дані діагностичного обстеження
25.	Е. А.А. 1963 р. чол.	14	13	СКХ, хронічний. простатит. везикуліт уретріт пілонефрит, захворюван- ня легенів.	Хворіє 5 років, болі проміжності, по ясн обл, дизурія, прискорений статевий акт	Локал болі поясн проміжності. УЗИ: СКХ, Калькул. простатит, пневмонія
26.	М. В.В. 1976 р. чол.	12	10	Хронічний простатит, везикуліт СКХ. Знижка статевої функції.	Хворіє 1 рік. болі проміжності, дизурія, знижка статевої функції.	Локал болі проміжності УЗИ: СКХ, Калькул. простатит.
27.	Б. А.А. 1949 р. чол.	11	12	СКХ, хронічний простатит, везикуліт уретрит знижка статевого акту.	хворіє 5 років. Болі в поясниці і в проміжності. дизурія, знижка статевого акту.	Локал болі пром УЗИ: СКХ Калькул. простатит.
28.	Б. Ю. М. 1971 р. чол.	11	13	СКХ, хронічний калькул. простатит. пілонефрит знижка статевого акту	Хворіє 2 роки Болі проміж. Знижка статевої функції, млява ерекція.	Локальні болі проміж. дизурія УЗИ: СКХ, кальк простатит.
29.	З. А. Е. 1975 р. чол.	12	12	СКХ, хронічний простатит. уретрит	хворіє 3 роки Болі поясниці і в проміжності. дизурія.	Локал болі поясн обл і проміжності УЗИ: СКХ заст простатит.

Закінчення таблиці 1

№ п/п	ПІБ Рік народ- ження. стать.	Екстра- інтро версія	Нейротизм- стабільність	Діагноз	Дані хворого Анамнез, скарги	Дані діагностичного обстеження
30.	А. П.П. 1964 р. чол.	13	11	Хронічний. простатит. прискорений статевий акт.	Хворіє 1 рік Болі в проміжності пояси області прискорене сім'явишорську- вання	Локальні болі проміжності дизурія УЗИ: СКХ, Калькул. простатит.
	Середній арифметичний показник	12,2	12,13			
	Середньо-квадратичне відхилення	1,41	1,41			

При визначенні середнього арифметичного показника шкали екстраверсії-інтроверсії групи пацієнтів — рівний — 12,2.

Середньоарифметичний показник за шкалою нейротизм-стабільність — рівний — 12,13.

При визначенні середнього квадратичного відхилення у вибірці за шкалами:

екстраверсії-інтроверсії — рівне 1,41;
нейротизм-стабільність — рівне 1,41.

$$E = 12,2 \pm 1,4$$

$$N = 12,1 \pm 1,4$$

При розгляді показників екстраверсії-інтроверсії і нейротизм-стабільність виділяється основна зона (12 ± 1) — зона "рівноважного" типу темпераменту з показниками екстраверсії-інтроверсії — 12 (± 1) і нейротизму-стабільності (12 ± 1) — в кількості — 19 чоловік (63,33%).

Група пацієнтів, що має відхилення за шкалою екстраверсії-інтрроверсії — показник відповідає — 10, складає — 3 особи (10%); а показник рівний — 14, має місце у 4 осіб (13,33 %), за шкалою нейротизму — показник рівний — 14, виділений у 5 осіб (16,66 %), нейротизм, де є показники — 10, визначені і виділені — 4 осіб (13,33%).

З цього можна визначити, що максимальний пік пацієнтів з хронічними неінфекційними захворюваннями урологічного профілю доводиться саме на "рівноважний" тип темпераменту — 12 (± 1).

Нами були проаналізовані також вікові прояви захворювань сечостатевої системи у чоловіків:

- пациєнти від 18 років до 25 років складають — 3 (10%) особи;
- пациєнти від 25 років до 30 років складають 12 (40%) осіб;
- пациєнти від 31 року до 40 років складають 8 (26,6%) осіб;
- пациєнти від 41 року до 50 років складають 3 (10%) особи;
- пациєнти від 51 року і вище складають 4 (13,33%) особи.

Віковий критерій від 25 до 35 років включає найбільше пацієнтів, що звернулися, в кількості 17 (56,66%) осіб. Пік тих, що звернулися на прийом із загостренням хронічної патології нирок і сечостатевої системи припадає на вік 30 (± 2) років — це 8 (26,66%) осіб.

Аналіз клінічних проявів перебігу захворювання дозволяє виділити і диференціювати локалізацію іrrадіації больового прояву порушень на поверхні тіла пацієнта за такими групами:

1. Чіткі рівноважні типи мають локалізацію болів як у області нирок, так і у області сечостатевих органів (проміжність, задній прохід, корінь мошонки і статевого члена, дизурія), тривалість захворювання від 1-го року до 5–20 років (залежить від віку пацієнта), причому урологічна патологія носить основний характер захворювання;

2. За шкалою екстраверсії-інтрроверсії $E < 12 - 1$ локалізація болів і прояв патології сечової системи більше з боку сечового міхура і простати (локалізація болі в проекції нижнього поверху черевної порожнини, а також статевих органів), спостерігається зниження статевої функції по типу загального зниження лібідо (млява ерекція, утруднене сім'явипорсування, стертість оргазму);

3. За шкалою екстраверсії-інтрроверсії $E > 12 + 1$ спостерігається переважання проявів захворювання з боку нирок (локалізація об'єктивних і суб'єктивних клінічних проявів захворювання спостерігається з переважанням у верхньому поверсі черевної порожнини), зміна статевої функції характеризується прискоренням статевого акту (швидке сім'явипорсування при нормальній ерекції).

4. За шкалою нейротизму $N < 12 - 1$ спостерігається процес хронічного запального ураження нирок і статевих органів по типу катарального процесу (набряклість, пастозність структури тканин органів з подальшим утворенням дрібних кальцинатів, а також рубцевою деформуючою зміною органів);

5. За шкалою нейротизму $N > 12 + 1$ більше переважає процес каменеутворення (кальцинати) у області нирок і сечостатевих органів при малій клінічній виразності прояву процесу.

При аналізі супутніх захворювань (підтвердження при ультразвуко-вому дослідження внутрішніх органів) наголошується характерний про-

яв захворювань, властивих тим типам темпераменту, залежно від того, в яку сторону спостерігається відхилення за шкалами екстраверсії-інтроверсії або нейротизму (прояв принципу захворювань, що "віддаються" перевазі, або "точки найменшого опору — locus minoris resistencia").

За шкалою $E > 12 + 1$ управо, спостерігаються захворювання з переважним ураженням нирок (спостерігається чіткий виразний процес каменеутворення, навіть серед молодих пацієнтів).

За шкалою $E < 12 - 1$ вліво спостерігається переважне ураження нижніх відділів сечових шляхів. Причому клінічні прояви захворювання строго дозволяють диференціювати дану патологію органів.

При показниках $E - 10$ і $N - 14$ — у чоловіків спостерігаються клінічні прояви (дані обстеження підтверджують) виразного запального характеру як нирок, так і простати, причому нерідко в процес зачленений і сечовий міхур. З супутньої патології спостерігаються такі захворювання як ураження підшлункової залози, цукровий діабет, коліт. Статева функція характеризується загальним зниженням лібідо.

При показниках $E - 14$ і $N - 10$ — у чоловіків спостерігається прояв каменеутворення сечової системи на тлі запального характеру процесу. Сама статева функція характеризується прискоренням статевого акту (швидке сім'явипорськування). З супутньої патології у анамнезі має перенесений інфаркт міокарду або підвищений артеріальний тиск серед цих пацієнтів.

При показниках $E > 13$ і $N > 13$ — у чоловіків має переважання ураження нирок, каменеутворення з провідним діагнозом (дизурія спостерігається унаслідок сечового діатезу з відділенням солей). Ураження простати відрізняє наявність дрібних кальцинатів, запальний процес млявий, особливо не турбує пацієнта. З супутньої патології має захворювання жовчовивідніх шляхів, при обстеженні ультразвукової діагностики спостерігається наявність холециститу, або аномалії розвитку жовчного міхура (перегини, деформація). Також з супутньої патології спостерігається ураження легенів, носоглотки, щитовидної залози.

При показниках $E < 11$ і $N > 10$ — у чоловіків спостерігається ураження простати на тлі застійного характеру, у даної групи пацієнтів як супутня патологія спостерігається ураження товстого кишечника, дисбактеріози, варикозне розширення судин, геморой.

Висновки

1. Аналіз одержаних даних дозволяє виділити основні індивідуально-психологічні параметри хворих урологічного профілю.
2. Виділені основні індивідуально-типологічні властивості підтверджують принадлежність урологічних хворих до "рівноважного" типу темпераменту.
3. Проведення аналізу структури психіки урологічних хворих дозволяє точно їх локалізувати і тонше диференціювати властиві їм відмінності у певних нозологіях як основної патології, так і супутніх захворювань.

Література

1. Айзенк Г. Ю. Психология: Польза и вред. Смысл и бессмыслица. Факты и вымысел / Г. Ю. Айзенк; Пер. В. В. Гуриновича. — Мн.: Харвест, 2003. — 912 с.
2. Барташов А. В. Психология индивидуальных отличий: От темперамента — к характеру и типологии личности. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. — 256 с.
3. Ильин Е. П. Психология индивидуальных отличий. — СПб.: Питер, 2004. — 701 с.: ил.
4. Простатиты / Юнда И. Ф. — К.: Здоров'я, 1987. — 192 с.
5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 2004. — 713 с.: ил.
6. Цуканов Б. И. Время в психике человека: монография. — Одесса: Астропrint, 2000. — 220 с.
7. Цуканов Б. И. Еволюційне відлуння індивідуальних відмінностей / Психологія і суспільство. — 2002. — № 2. — С. 126–148.
8. Шапарь В. Б. Словарь практического психолога / В. Б. Шапарь. — М.: ООО "Издательство АСТ"; Харьков: "Торсинг", 2004. — 734, (2) с.
9. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Баумана. — СПб.: Питер, 2003. — 1312 с.

С. М. Бондаревич, соискатель

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова,
Кафедра дифференциальной и экспериментальной психологии

ИНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БОЛЬНИХ УРОЛОГІЧЕСКОГО ПРОФІЛЯ

Резюме

В статье раскрывается проблема по определению основных индивидуально-типологических свойств больных, страдающих урологическими заболеваниями. Проведен подробный анализ психики субъектов. Приводится методический инструментарий, позволяющий строго локализовать их в зоне "равновесного типа" темперамента.

Ключевые слова: "урологический профиль", "равновесный тип темперамента", "предпочитаемые заболевания".

C. M. Bondarevich,

Odessa national university the name I. I. Mechnikova

INDIVID-TIPOLOGICAL PROPERTIES OF PATIENTS OF UROLOGY TYPE

Summary

In the article a problem opens up on determination of basic individ-typological properties of patients suffering by the urologies diseases. The detailed analysis of psyche of subjects is conducted. A methodical instrument over, allowing strictly to localize them in the area of "ravnoesny type" of temperament, is brought.

Keywords: "urology type", "ravnoesny" type of temperament, "preferred diseases".